

Úľava od príznakov spojených s nadúvaním a plynatosťou.
Pôsobí proti gastrointestinálnym plynom.

1. Identifikácia, zloženie a účel zdravotníckej pomôcky

CarboS⁺ je zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha uľaviť od príznakov spojených s nadúvaním a plynatosťou čriev v dôsledku hromadenia plynov. CarboS⁺ pôsobí proti krčmom a bolestiam s nimi súvisiacimi a zabraňuje plynatosti a nadúvaniu.

1. 1. Mechanizmus účinku

Účinnosť prostriedku je spôsobená protipenivým účinkom simetikónu v kombinácii s adsorbentným účinkom aktívneho uhlia proti črevným plynom: účinok zdravotníckej pomôcky je preto založený len na javoch mechanického charakteru. Dvojvrstvová tableta umožňuje uvoľniť okolo 50 % zložiek v žalúdku do 15 minút po užití prípravku, zatiaľ čo úplný rozpad tablety nastane v črevnom prostredí do 1 hodiny. Zložky nie sú absorbované v gastrointestinálnom trakte a nenarúšajú absorpciu živín.

1. 2. Zložky

Každá tableta obsahuje:

- Simetikón 50 mg
- Aktívne uhlie 300 mg

Pomocné látky: Maltodextrín, sacharóza, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, polyvinylpyrrolidón, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, polyvinylpolypyrrolidón, glycerol behenát, oxid kremičitý, stearát horečnatý.

2. Balenie

Každá škatulka obsahuje 20 dvojvrstvových jednorazových tabliet.

3. Dávkovanie a spôsob užívania

Dospelí: Odporúča sa užívať 1 – 2 tablety po dvoch hlavných jedlách, maximálne 4 tablety denne.

Dospievajúci vo veku 14 až 18 rokov: 1 tableta po dvoch hlavných jedlách, maximálne 2 tablety denne.

Tabletu vyberte z blistra a užite s pohárom vody.

4. Vedľajšie účinky

Pri odporúčaných dávkovaniach možno pozorovať hneď farbu stolice v dôsledku prítomnosti uhlia. Jav je fyziologický a nemá žiadny patologický význam. V strednodobom/dlhodobom horizonte nie sú známe žiadne významné vedľajšie účinky. Výrobok neovplyvňuje negatívne úroveň pozornosti. Môžu sa vyskytnúť aj iné vedľajšie účinky, než ktoré sú uvedené: v prípade výskytu neočakávaných príznakov sa obráťte na lekára.

5. Interakcie s doplnkami stravy a s liekmi

Adsorbentný účinok uhlia a simetikónu môže nepriaznivo ovplyvňovať účinnosť ďalších súčasne užívaných liekov. V prípade súběžných liekových terapií sa pred užitím prípravku obráťte na lekára.

Simetikón môže zabraňovať účinku niektorých číndiel používaných pri diagnostike, ako je guajaková guma.

6. Skladovanie

Prípravok CarboS⁺ uchovávejte v suchu a mimo dosahu priameho tepla alebo svetelných zdrojov: blister otvorte len v prípade použitia. Nepoužívajte v prípade, že je obal poškodený. Uchovávejte mimo dosahu detí. Prípravok uchovávať pri teplote do 25 °C.

7. Varovania a bezpečnostné upozornenia

Nepoužívajte u osôb mladších ako 14 rokov.

Uchovávejte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume expirácie vytlačenom na škatuľke.

Neužívajte v ľahu.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Každá tableta je jednorazová a mala by sa vybrať z obalu bezprostredne pred konzumáciou. Nepoužívajte čiastočne použité tablety (drevné či rozlomené) alebo vytiahnuté z blistra v neznámom čase, pretože toto nesprávne použitie môže predstavovať riziko kontaminácie prípravku.

Nepoužívajte v prípade žalúdočných alebo črevných lézií.

Nepoužívajte v prípade črevnej obštrukcie.

V **tehotenstve alebo pri dojčení** užívajte zdravotnícku pomôcku len v prípade potreby a po konzultácii s lekárom.

Neprekráčajte odporúčanú dávku, pretože vyššie množstvá môžu spôsobiť výskyt nepriaznivého účinku.

Prípravok neužívajte dlhšie než 30 po sebe nasledujúcich dní.

Ac príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára.

Neužívajte v prípade intolerancie na prípravok.

Neužívajte v prípade známej precitlivosti na zložky prípravku.

8. Dátum expirácie

Nepoužívajte po dátume expirácie vytlačenom na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na výrobok, ktorý je správne skladovaný v neporušenom obale.

9. Likvidácia

S prípravkom po uplynutí dátumu expirácie sa musí zaobchádzať podľa predpisov vedúceho pracovníka miestneho subjektu pre nakladanie s odpadom.

V žiadnom prípade nevyhadzujte výrobok ani jeho obal voľne do životného prostredia.

Posledná revízia: 10/2021

Łagodzenie objawów związanych ze wzdęciami i uczuciem pełności. Przeciwdziała gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym.

1. Identyfikacja, skład i przeznaczenie wyrobu medycznego
CarboS⁺ to wyrób medyczny łagodzący objawy związane ze wzdęciami i uczuciem pełności w jelitach, spowodowanych nagromadzeniem się gazów. CarboS⁺ przeciwdziała skurczom i towarzyszącym im bólom oraz zapobiega wzdęciom.

1. 1. Mechanizm działania

Skuteczność wyrobu wynika z przeciwpieniącego działania symetykonu w połączeniu z adsorbującym działaniem węgla drzewnego na gazy jelitowe: działanie wyrobu medycznego wynika zatem wyłącznie ze zjawisk natury mechanicznej. Tabletki dwuwarstwowa pozwala na uwolnienie około 50% składników w żołądku w ciągu 15 minut od połknięcia wyrobu, natomiast całkowity rozkład tabletki następuje w środowisku jelitowym w ciągu 1 godziny. Składniki nie są wchłaniane w przewodzie pokarmowym ani nie zaburzają wchłaniania substancji pokarmowych.

1. 2. Skład

Każda tabletki zawiera:

- Symetykon 50 mg
- Węgiel 300 mg

Substancje pomocnicze: Maltodekstryna, sacharoza, celuloza mikrokryształczna, hydroksypropylometyloceluloza, poliwinylolipirolidon, krzemionka koloidalna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowanej, poliwinylpolipirolidon, behenian glicerolu, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.

2. Opakowanie

Każde opakowanie zawiera 20 dwuwarstwowych tabletek jednorazowego użytku.

3. Dawkowanie i sposób użycia

Dorośli: Zaleca się przyjmowanie 1-2 tabletek po dwóch głównych posiłkach, maksymalnie do 4 tabletek dziennie.

Młodzież w wieku od 14 do 18 lat: 1 tabletki po dwóch głównych posiłkach, maksymalnie do 2 tabletek dziennie.

Należy wyjąć tabletkę z blistra i połknąć ją, popijając szklanką wody.

4. Działania niepożądane

Przy zalecanych dawkach można zaobserwować brązowe zabarwienie kału spowodowane obecnością węgla. Jest to objaw fizjologiczny i nie jest objawem zmian patologicznych. Nie są znane żadne istotne działania niepożądane średnio- i długoterminowe. Produkt nie wpływa negatywnie na koncentrację. Mogą wystąpić działania niepożądane inne niż podane powyżej: w przypadku wystąpienia niespodziewanych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Działanie adsorbujące węgla i symetykonu może niekorzystnie wpływać na skuteczność innych leków stosowanych jednocześnie. W przypadku jednoczesnego stosowania leków, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Symetykon może hamować działanie niektórych odczynników stosowanych w diagnostyce, takich jak żywica gwajakowa.

6. Przechowywanie

CarboS⁺ należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła: blister otwierać tylko w przypadku zazywania wyrobu. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Nie przyjmować w pozycji leżącej. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Każda tabletką jest przeznaczona do jednorazowego użytku i powinna być wyjęta z opakowania bezpośrednio przed jej zajęciem. Nie przyjmować częściowo zużytych tabletek (pokruszonych lub połamanych) ani wyjętych z blistra w nieznanym czasie, ponieważ takie niewłaściwe użycie może stwarzać ryzyko zanieczyszczenia produktu. Nie stosować w przypadku zmian żołądkowych ani jelitowych. Nie stosować w przypadku niedrożności jelit. W przypadku **cięży lub karmienia piersią** wyrób medyczny należy stosować tylko w razie potrzeby i po konsultacji z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dawki, gdyż większe ilości mogą spowodować wystąpienie działań niepożądanych. **Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 kolejnych dni. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.** Nie przyjmować w przypadku nietolerancji produktu. Nie przyjmować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki preparatu.

8. Termin ważności

Nie przyjmować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności dotyczy prawidłowo przechowywanego produktu w nienaruszonym opakowaniu.

9. Użyłazacja

Przeterminowany wyrób należy zutyłizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami. Nie wolno wyrzucać produktu ani jego opakowania do środowiska. Data ostatniej rewizji: 10/2021

Dr.Max⁺

CarboS+

RO Comprimate bistratificate

Instrucțiuni de utilizare

Ameliorarea simptomelor asociate balonării și flatulenței. Combate gazele gastrointestinale.

1. Identificarea, compoziția și scopul dispozitivului medical

CarboS+ este un dispozitiv medical util în ameliorarea simptomelor asociate balonării și flatulenței cauzate de acumularea gazelor. CarboS+ combate crampele și durerea asociată acestora și previne flatulența și balonarea.

1.1. Mecanism de acțiune

Eficacitatea dispozitivului este datorată acțiunii antispumante a simeticonei în combinație cu acțiunea adsorbantă a cărbunelui împotriva gazelor intestinale; astfel, acțiunea dispozitivului medical se bazează exclusiv pe fenomene de natură mecanică. Comprimatul bistratificat permite eliberarea în stomac a aproximativ 50% din ingrediente în decurs de 15 minute de la ingerarea dispozitivului, în timp ce dezintegrarea completă a comprimatului are loc în intestin în decurs de o oră. Componentele sunt absorbite în tractul intestinal și nu interferează cu absorbția substanțelor nutritive.

1.2. Componente

Fiecare comprimat conține:

- Simeticonă 50 mg
- Cărbune 300 mg

Excipienți: Maltodextrină, sucroză, celuloză microcristalină, hidroxi-propilmetilceluloză, polivinilpirolidonă, siliciu coloidal, croscarmeloză de sodiu, polivinilpolipirolidonă, behenat de glicerol, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.

2. Ambalaj

Fiecare cutie conține 20 comprimate bistratificate de unică folosință.

3. Dozaj și instrucțiuni de utilizare

Adulți: Se recomandă administrarea a 1–2 comprimate după cele două mese principale, până la maximum 4 comprimate pe zi.
Adolescenți cu vârsta între 14 și 18 ani: 1 comprimat după cele două mese principale, până la maximum 2 comprimate pe zi.
Scoateți comprimatul din blister și înghițiți-l cu un pahar cu apă.

4. Efecte secundare

La administrarea dozelor recomandate, se pot observa fecale de culoare maronie din cauza prezenței cărbunelui. Fenomenul este fiziologic și nu sugerează o cauză patologică. Nu sunt cunoscute efecte secundare pe termen mediu/lung. Produsul nu afectează în mod negativ nivelul de atenție. Pot apărea și efecte secundare diferite de cele prezentate: consultați un medic în cazul apariției unor simptome neașteptate.

5. Interacțiuni cu suplimente alimentare și alte medicamente

Acțiunea adsorbantă a cărbunelui și simeticonei poate afecta în mod advers eficacitatea altor medicamente luate concomitent. În cazul unor tratamente medicamentoase concomitente, consultați medicul înainte de administrarea produsului. Simeticona poate împiedica efectul unor reactivi utilizați în diagnosticare, cum ar fi guma de guaiac.

6. Depozitare

Păstrați CarboS+ într-un loc uscat, departe de razele solare directe sau surse de lumină: îndepărtați comprimatele din blister numai atunci când le luați. A nu se utiliza, în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați dispozitivul la o temperatură sub 25 °C.

7. Avertizări și precauții

Nu utilizați produsul dacă nu ați împlinit 14 ani.
Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor.
Nu utilizați produsul ulterior datei de expirare indicate pe cutie.
Nu administrați produsul stând în poziție orizontală.
Nu utilizați produsul, dacă ambalajul este deteriorat.
Fiecare comprimat este de unică folosință și trebuie scos din ambalaj imediat înainte de a fi administrat. Nu luați comprimate utilizate parțial (zdrobite sau crăpate) sau fără a ști când au fost scoase din blister, întrucât acest lucru poate reprezenta un risc de contaminare a produsului.
A nu se utiliza în caz de leziuni gastrice sau intestinale.
A nu se utiliza în caz de blocaj intestinal.
În caz de **sarcină sau alăptare**, luați dispozitivul medical numai dacă este necesar și după consultarea unui medic.
A nu se depăși doza sugerată, întrucât cantități mai mari pot cauza apariția efectelor secundare.
A nu se utiliza produsul mai mult de 30 zile consecutive. Adresați-vă medicului, dacă simptomele persistă.
Nu luați în caz de intoleranță la produs.
Nu luați în caz de hipersensibilitate cunoscută la componentele produsului.

8. Data de expirare

Nu utilizați produsul ulterior datei de expirare indicate pe ambalaj. Data de expirare se referă la produs în ambalajul său intact depozitat corespunzător.

9. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie gestionat conform regulamentelor privind gestionarea deșeurilor aparținând Entității Locale.
În niciun caz, nu eliminați produsul sau ambalajul acestuia în natură.
Ultima revizie: 10/2021

 Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	CarboS+		Black		
BAR CODE:	8595566417390				
DIMENSION (rozměr):	140 x 300 mm				
DATE:	05. 11. 2021				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					