

SK Islandský lišajník

Sirup

Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

Dr.Max⁺

1. Účel použitia zdravotníckej pomôcky

Sirup s islandským lišajníkom je zdravotnícka pomôcka používaná na ochranu a zvlhčenie sliznice ústnej dutiny a hrdla. Prípravok zmiernuje príznaky suchého kašľa, chrapotu, ako aj pocitu sucha, pálenia a bolesti v krku.

Extrakt z islandského lišajníka obsahuje množstvo slizovitých látok tvoriacich ochranný povlak, ktorý znižuje citlivosť na vonkajšie dráždivé faktory. Obsah ochranného povlaku uľahčuje prehĺtanie a znižuje reflex kašľa.

Sirup s islandským lišajníkom je možné použiť ako pomocný prípravok pri bakteriálnych a vírusových infekciách (napr. nachladnutie, angína), ako aj po chorobách na zmiernenie podráždenia sliznice ústnej dutiny a hrdla.

Tento prípravok sa odporúča pre ľudí, ktorí:

- pociťujú príznaky suchého, dráždivého kašľa,
- pociťujú podráždenie, bolesť v krku,
- pociťujú bolesť a pálenie pri prehĺtaní,
- pociťujú sucho v ústach a hrdle spôsobené vonkajšími faktormi (napr. pobyt v nevetraných, silne vykurovaných alebo klimatizovaných miestnostiach),
- pociťujú zachrípnutie, ktoré sa môže okrem iného objaviť v dôsledku namáhania hlasiviek.

2. Zloženie

Extrakt z islandského lišajníka (*Cetraria islandica* L. *Acharius*), voda, sacharóza, glycerol, benzoan sodný, xantánová guma, kyselina citrónová, prírodná jahodová príchuť.

Sirup je balený v 200 ml sklenenej fľaši. Balenie obsahuje kartónovú škatuľu, fľašu s etiketou, odmerku a návod na použitie.

3. Spôsob užívania

Zdravotnícka pomôcka určená na užitie dospelými a deťmi staršími ako 1 rok.

Prípravok môžu užívať aj tehotné a dojčiacie ženy po konzultácii s lekárom.

Na odmeranie primeranej dávky sirupu použite odmerku, ktorá je súčasťou balenia.

Malým deťom by mala prípravok podávať dospelá osoba.

Deti vo veku od 1 do 6 rokov: 5 ml sirupu 1 – 2 krát denne, podľa potreby.

Deti a dospelávajúci od 6 do 18 rokov: 5 ml sirupu 3 – 4 krát denne, podľa potreby.

Dospelí: 10 ml sirupu 3 – 4 krát denne, podľa potreby.

Pred použitím fľašu dobre pretrepte.

Po užití približne pol hodinu nepite ani nejedzte, aby sa zachovali vlastnosti ochrannej vrstvy.

Je možné ho užívať bez ohľadu na dennú dobu.

Po každom použití opláchnite odmerku vlažnou vodou a nechajte ju uschnúť (nepoužívajte čistiace prostriedky ani umývačku riadu).

4. Skladovanie

Skladujte v originálnom balení pri teplote 15 – 25 °C. Chráňte pred svetlom a vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Výrobok nepoužívajte po dátume expirácie.

5. ⚠ Upozornenia

Neužívajte v prípade alergie alebo precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku prípravku.

Pri nadmernom užití môže u detí vyvolať laxatívne účinky.

Používajte iba v súlade s návodom na použitie.

Používanie prípravku u detí mladších ako 1 rok je potrebné konzultovať s lekárom.

V prípade pochybností konzultujte užívanie prípravku so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vzhľadom na obsah sacharózy (810 mg / 5 ml) sa u diabetikov odporúča opatrnosť.

Ak produkt užívate ako pomocný prostriedok na zmiernenie prejavov zápalu sliznice ústnej dutiny a hrdla, a príznaky nezmiznú po 7 dňoch alebo sa zhoršia, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

6. Symboly a označenie

Symboly na obale	
	Výrobca
	Minimálna trvanlivosť
	Číslo šarže
	Prečítajte si návod na použitie
	Teplotné obmedzenie
	Upozornenie



Curtis Health Caps S.A.,
Wysogotowo, ul. Batorowska 52,
62-081 Przeźmierowo, Poland

Distribútor:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika



02/21

PL Porost islandzki

Syrop

Instrukcja używania wyrobu medycznego

Dr.Max⁺

1. Wskazania

Syrop z porostu islandzkiego to wyrób medyczny stosowany w celu ochrony i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Preparat łagodzi objawy suchego kaszlu, chrypki, a także uczucie suchości, pieczenia i bólu gardła.

Zawarty w produkcie wyciąg z porostu islandzkiego zawiera liczne substancje śluzowe tworzące powłokę ochronną, która ogranicza podatność na zewnętrzne czynniki drażniące.

Zawartość substancji powlekającej ułatwia przełykanie i ogranicza odruch kaszlu.

Syrop z porostu islandzkiego może być stosowany jako środek pomocniczy podczas infekcji bakteryjnych i wirusowych (np. przeziębienia, angina), a także po przebytych chorobach, w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Preparat jest zalecany osobom:

- odczuwającym objawy suchego, drażniącego kaszlu,
- odczuwającym podrażnienie, ból gardła,
- którym towarzyszy uczucie bólu i pieczenia podczas przełykania,
- odczuwającym uczucie suchości jamy ustnej i gardła spowodowane czynnikami zewnętrznymi (m.in. przebywaniem w pomieszczeniach niewietrzonych, silnie ogrzewanych lub klimatyzowanych),
- odczuwającym objawy chrypki, która może pojawiać się m.in. w wyniku nadwyżęzania strun głosowych.

2. Skład

Wyciąg z plechy porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* L. *Acharius*), woda, sacharoza, glicerol, benzoesan sodu, guma ksantanowa, kwas cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy.

Syrop pakowany jest w szklaną butelkę o pojemności 200 ml. Opakowanie zawiera kartonik, butelkę z etykietą, kieliszek miarowy oraz instrukcję używania.

3. Sposób zastosowania

Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 1 roku życia. Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

W celu odmierzenia odpowiedniej dawki syropu należy posługiwać się kieliszkiem miarowym dołączonym do opakowania.

W przypadku małych dzieci produkt podaje osoba dorosła.

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 5 ml syropu 1–2 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat: 5 ml syropu 3–4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Dorośli: 10 ml syropu 3–4 razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelką.

Przez około pół godziny po zażyciu nie należy pić ani spożywać posiłków, aby zachować właściwości powłoki ochronnej.

Może być używany niezależnie od pory dnia.

Po każdym użyciu należy przepłukać kieliszek miarowy letnią wodą, pozostawić do wysuszenia (nie stosować środków i urządzeń do czyszczenia - zmywarka).

4. Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15–25°C. Chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu butelki zużyć w ciągu 30 dni.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

5. ⚠ Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

U dzieci może wywołać efekt przeczyszczający, jeśli jest stosowany w zbyt dużej ilości.

Należy stosować tylko zgodnie z instrukcją używania.

Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na zawartość sacharozy (810 mg/ 5ml) zaleca się ostrożność w stosowaniu u osób chorych na cukrzycę.

Jeżeli wyrób jest stosowany pomocniczo podczas infekcji bakteryjnych i wirusowych, a objawy nie ustępują lub nasilają się po 7 dniach należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Symbole i oznaczenia

Symbole użyte na opakowaniu	
	Wytwórca
	Użyć do daty
	Kod partii
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Dopuszczalna temperatura
	Ostrzeżenie



Curtis Health Caps S.A.,
Wysogotowo, ul. Batorowska 52,
62-081 Przeźmierowo, Poland

Dystrybutor:

Dr.Max Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60a,
54-613 Wrocław, Polska



02/21



Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

COLORS

SPECIALS

REMARKS

FAMILY	HERBALS		BLACK		
NAME	ISLANDSKÝ LIŠEJNÍK SIRUP 200 ml (PL/SK) – PIL				
BAR CODE	8595566415587				
DIMENSION	160 × 180 mm				
WEIGHT CARTON	60 g/m ²				
VERSION	1558_Islandsky_Lisejnik_sirup_200ml_PIL_160x180_SK-PL_1-17				
DATE	04. 03. 2021				
ARTWORK SUPPLIER	PROMOANGEL s.r.o.				