

Úľava od príznakov spojených s nadúvaním a plynatosťou. Pôsobí proti gastrointestinálnym plynom.

1. Identifikácia, zloženie a účel zdravotníckej pomôcky

CarboS⁺ je zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha uľaviť od príznakov spojených s nadúvaním a plynatosťou čriev v dôsledku hromadenia plynov. CarboS⁺ pôsobí proti krčom a bolestiam s nimi súvisiacimi a zabraňuje plynatosti a nadúvaniu.

1. 1. Mechanizmus účinku

Účinnosť prostriedku je spôsobená protipenivým účinkom simetikónu v kombinácii s adsorbentným účinkom aktívneho uhlia proti črevným plynom: účinok zdravotníckej pomôcky je preto založený len na javoch mechanického charakteru. Dvojvrstvová tableta umožňuje uvoľniť okolo 50 % zložiek v žalúdku do 15 minút po užití prípravku, zatiaľ čo úplný rozpad tablety nastane v črevnom prostredí do 1 hodiny. Zložky nie sú absorbované v gastrointestinálnom trakte a nenarúšajú absorpciu živín.

1. 2. Zložky

Každá tableta obsahuje:

- Simetikón 50 mg
- Aktívne uhlie 300 mg

Pomocné látky: Maltodextrín, sacharóza, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, polyvinylpyrrolidon, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, polyvinylpyrrolidon, glycerol behenát, oxid kremičitý, stearát horečnatý.

2. Balenie

Každá škatuľka obsahuje 20 dvojvrstvových jednorazových tabliet.

3. Dávkovanie a spôsob užívania

Dospelí: Odporúča sa užívať 1 – 2 tablety po dvoch hlavných jedlách, maximálne 4 tablety denne.

Dospievajúci vo veku 14 až 18 rokov: 1 tableta po dvoch hlavných jedlách, maximálne 2 tablety denne.

Tabletu vyberte z blistra a užite s pohárom vody.

4. Vedľajšie účinky

Pri odporúčaných dávkovaniach možno pozorovať hneď farbu stolice v dôsledku prítomnosti uhlia. Jav je fyziologický a nemá žiadny patologický význam. V strednodobom/dlhodobom horizonte nie sú známe žiadne významné vedľajšie účinky. Výrobok neovplyvňuje negatívne úroveň pozornosti. Môžu sa vyskytnúť aj iné vedľajšie účinky, než ktoré sú uvedené: v prípade výskytu neočakávaných príznakov sa obráťte na lekára.

5. Interakcie s doplnkami stravy a s liekmi

Adsorbentný účinok uhlia a simetikónu môže nepriamo ovplyvňovať účinnosť ďalších súčasne užívaných liekov. V prípade súbežných liekových terapií sa pred užitím prípravku obráťte na lekára. Simetikón môže zabraňovať účinku niektorých činidiel používaných pri diagnostike, ako je guajaková guma.

6. Skladovanie

Prípravok CarboS⁺ uchovávať v suchu a mimo dosahu priameho tepla alebo svetelných zdrojov: blister otvorte len v prípade použitia. Nepoužívajte v prípade, že je obal poškodený. Uchovávať mimo dosahu detí. Prípravok uchovávať pri teplote do 25 °C.

7. Varovania a bezpečnostné upozornenia

Nepoužívajte u osôb mladších ako 14 rokov.

Nepoužívajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume expirácie vytláčenom na škatuľke.

Neužívajte v ťahu.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Každá tableta je jednorazová a mala by sa vybrať z obalu bez prostredne pred konzumáciou. Nepoužívajte čiastočne použité tablety (drevén či rozložené) alebo vytiahnuté z blistra v neznámom čase, pretože toto nesprávne použitie môže predstavovať riziko kontaminácie prípravku.

Nepoužívajte v prípade žalúdočných alebo črevných lézií.

Nepoužívajte v prípade črevnej obštrukcie.

V tehotenstve alebo pri dojčení užívajte zdravotnícku pomôcku len v prípade potreby a po konzultácii s lekárom.

Neprekračujte odporúčanú dávku, pretože vyššie množstvo môžu spôsobiť výskyt črevného obštrukcie.

Prípravok neužívajte dlhšie než 30 po sebe nasledujúcich dní. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára.

Neužívajte v prípade intolerancie na prípravok.

Neužívajte v prípade známej precitlivenosti na zložky prípravku.

8. Dátum expirácie

Nepoužívajte po dátume expirácie vytláčenom na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na výrobok, ktorý je správne skladovaný v neporušenom obale.

9. Likvidácia

S prípravkom po uplynutí dátumu expirácie sa musí zaobchádzať podľa predpisov vedúceho pracovníka miestneho subjektu pre nakladanie s odpadom.

V žiadnom prípade nevyhadzujte výrobok ani jeho obal voľne do životného prostredia.

Posledná revízia: 10/2021

Łagodzenie objawów związanych ze wzdęciami i uczuciem pełności. Przeciwdziała gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym.

1. Identyfikacja, skład i przeznaczenie wyrobu medycznego

CarboS⁺ to wyrób medyczny łagodzący objawy związane ze wzdęciami i uczuciem pełności w jelitach, spowodowanych nagromadzeniem się gazów. CarboS⁺ przeciwdziała skurczom i towarzyszącym im bólowi oraz zapobiega wzdęciom.

1. 1. Mechanizm działania

Skuteczność wyrobu wynika z przeciwpieniącego działania symetykonu w połączeniu z adsorbującym działaniem węgla drzewnego na gazy jelitowe: działanie wyrobu medycznego wynika zatem wyłącznie ze zjawisk natury mechanicznej. Tabletki dwuwarstwowa pozwala na uwolnienie około 50% składników w żołądku w ciągu 15 minut od połknięcia wyrobu, natomiast całkowity rozkład tabletki następuje w środowisku jelitowym w ciągu 1 godziny. Składniki nie są wchłaniane w przewodzie pokarmowym ani nie zaburzają wchłaniania substancji pokarmowych.

1. 2. Skład

Każda tabletki zawiera:

- Symetykon 50 mg
- Węgiel 300 mg

Substancje pomocnicze: Maltodekstryna, sacharaza, celuloza mikrokryształiczna, hydroksypropylometylceluloza, poliwinylpyrrolidon, krzemionka koloidalna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowanej, poliwinylpolipirrolidon, behenian glicerolu, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.

2. Opakowanie

Każde opakowanie zawiera 20 dwuwarstwowych tabletek jednorazowego użytku.

3. Dawkowanie i sposób użycia

Dorośli: Zaleca się przyjmowanie 1-2 tabletek po dwóch głównych posiłkach, maksymalnie do 4 tabletek dziennie.

Młodzież w wieku od 14 do 18 lat: 1 tabletki po dwóch głównych posiłkach, maksymalnie do 2 tabletek dziennie.

Należy wyjąć tabletkę z blistra i połknąć ją, popijając szklanką wody.

4. Działania niepożądane

Przy zalecanych dawkach można zaobserwować brązowe zabarwienie kału spowodowane obecnością węgla. Jest to objaw fizjologiczny i nie jest objawem zmian patologicznych. Nie są znane żadne istotne działania niepożądane średnio- i długoterminowe. Produkt nie wpływa negatywnie na koncentrację. Mogą wystąpić działania niepożądane inne niż podane powyżej: w przypadku wystąpienia niespodziewanych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Działanie adsorbujące węgla i symetykonu może niekorzystnie wpływać na skuteczność innych leków stosowanych jednocześnie. W przypadku jednoczesnego stosowania leków, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Symetykon może hamować działanie niektórych odczynników stosowanych w diagnostyce, takich jak żywica gwajakowa.

6. Przechowywanie

CarboS⁺ należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła: blister otwierać tylko w przypadku zażywania wyrobu. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.