

1. Identifikace, složení a účel zdravotnického prostředku

Dr. Max Macroglol je laxativní zdravotnický prostředek, který díky osmotickému působení přirozeně reguluje funkci střeva. Ve střevě se nevstřebává ani nekvásí, nedráždí sliznici a vylučuje se stolicí. **Dr. Max Macroglol** je vhodný zejména při chronické zácpě a občasné nepravidelné stolici. Díky své afinitě k vodě **Dr. Max Macroglol** změkčuje stolicí a usnadňuje její vyprazdňování, aniž by způsoboval křeče nebo bolesti břicha nebo jiné nálehavé stavy. Jeho účinnost se časem nesnižuje.

1.1 Složení

Jeden sáček obsahuje: 10 g Makrogolu 3350.

Pomocné látky: Oxid křemičitý, aroma, sodná sůl sacharinu.

2. Balení

Dr. Max Macroglol se dodává ve formě prášku pro přípravu perorálního roztoku. Balení obsahuje 14 jednorázových sáčků.

3. Dávkování a způsob použití:

Děti od 6 měsíců do 2 let (do 12 kg): 1 sáček (10 g) denně.

Děti od 2 do 11 let (od 12 kg do 20 kg): 1–2 sáčky (každý po 10 g) denně.

Dospělí a děti starší 11 let (nebo nad 20 kg): 1–3 sáčky (každý po 10 g) denně.

Obsah jednoho sáčku rozpustíte v 62,5 ml (asi půl sklenice) neperlivé vody. Denní dávku je možné rozdělit do několika podání. Dávku je možné zvýšit nebo snížit v závislosti na individuální odpovědi na léčbu. V každém případě doporučujeme konzultaci s lékařem. U dětí používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Obvykle maximální potřebná dávka nepřesahuje 3 sáčky denně.

4. Kontraindikace

Neužívejte **Dr. Max Macroglol** u následujících stavů:

- zúžení střeva,
 - perforace střeva,
 - závažné onemocnění střev (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).
- Nepoužívejte v případě střevní neprůchodnosti.**

Neexistují žádné zkušenosti s užíváním během těhotenství a kojení, proto užívejte **Dr. Max Macroglol** pouze v nezbytných případech na doporučení lékaře.

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování.

Délka léčby přípravkem **Dr. Max Macroglol** by neměla přesáhnout 2 týdny. V případě potřeby lze léčbu opakovat. V případě refrakterní a/nebo chronické zácpy může být nutné delší užívání. Taková zácpa může být způsobena léky, např. léky proti bolesti (opioidy) a léky pro léčbu Parkinsonovy choroby (anticholinergika), nebo se může objevit v případě onemocnění, jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, kdy může způsobit refrakterní zácpu.

5. Nežádoucí účinky

Při dávkách nezbytných k dosažení terapeutického účinku nebyl nikdy hlášen výskyt nežádoucích účinků.

Někdy se mohou objevit gastrointestinální poruchy, borborygmy, bolesti břicha, nevolnost a mírný průjem (zejména zpočátku). Vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce (např. vyrážka a kopřivka).

V případě výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků, včetně nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud příznaky přetrvávají, obraťte se na svého lékaře.

Pokud si zapomenete vzít jednu dávku, neužívejte dvojnásobnou dávku, ale počkejte a užijte další dávku.

6. Lékové interakce

Dosud nejsou známy žádné interakce s jinými léky, je však vhodné odložit užití přípravku minimálně o 2 hodiny po podání perorálně užívaných léků nebo jiných přípravků (včetně homeopatik) nebo doplňků stravy, protože osmotická síla makrogolu a navozená zvýšená rychlost gastrointestinálního průchodu mohou nepříznivě ovlivnit jejich účinnost. Pokud užíváte jiné léky, poraďte se před užitím přípravku **Dr. Max Macroglol** se svým lékařem.

7. Skladování

Přípravek **Dr. Max Macroglol** uchovávejte na suchém místě a chráňte před přímým účinkem tepla a světla: sáček otevírejte pouze při použití. Nepoužívejte, je-li sáček poškozený. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.

8. Upozornění a preventivní opatření

Perorální suspenze má být připravena těsně před užitím přípravku. Nepoužívejte přípravek u dětí do 6 měsíců věku. Doporučuje se nepřekračovat doporučená množství, protože vyšší dávky mohou způsobit výskyt neočekávaných nežádoucích účinků. Těhotné nebo kojící ženy by měly užívat **Dr. Max Macroglol** pouze po konzultaci s lékařem. Během léčby přípravkem **Dr. Max Macroglol** je vhodné dodržovat příslušnou dietu a užívat perorální rehydratační roztoky (ORS), aby se předešlo dehydrataci. Poradte se s lékařem. Nepoužívejte déle než 30 po sobě jdoucích dnů. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem. Nepoužívejte v případě nesnášenlivosti produktu. Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na složky přípravku a polyethylenglykol. Každý sáček je jednorázový a měl by být otevřen pouze v době použití.

9. Datum použitelnosti

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje na přípravek řádně uchovávaný v neporušeném obalu.

10. Likvidace

S prostředkem, kterému uplynula doba použitelnosti, je třeba zacházet v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. V žádném případě nevyhazujte prostředek ani jeho balení do běžného odpadu.

Datum poslední revize: 03/2025

1. Identifikácia, zloženie a účel MD

Dr. Max Macroglol je zdravotnícka pomôcka s laxatívnym účinkom, ktorá prostredníctvom osmotického pôsobenia prirodzeným spôsobom reguluje činnosť čriev. Nevstrebáva sa ani nekvásí v črevách, nedráždí sliznicu a vylučuje sa stolicou. **Dr. Max Macroglol** je vhodný najmä pri chronickej zápchy a občasnej nepravidelnej stolici. **Dr. Max Macroglol** totiž vďaka svojej afinitě k vode zmäkčuje stolicu, čím uľahčuje vyprázdňovanie bez toho, aby spôsoboval kŕče alebo bolesti brucha, alebo naliehavé stavy. Jeho účinnosť sa časom neznižuje.

1.1 Zloženie

Každé vrecko obsahuje: 10 g Macroglol 3350.

Pomocné látky: Oxid kremičitý, aróma, sacharínat sodný.

2. Balenie

Dr. Max Macroglol je vo forme prášku na prípravu perorálneho roztoku. Skatúľka obsahuje 14 jednorazových vreciek.

3. Dávkovanie a spôsob použitia:

Deti od 6 mesiacov do 2 rokov (do 12 kg): 1 vrecko (každé po 10 g) denne.

Deti od 2 do 11 rokov (od 12 kg do 20 kg): 1–2 vrecká (každé po 10 g) denne.

Dospelí a deti staršie ako 11 rokov (alebo nad 20 kg): 1–3 vrecká (každé po 10 g) denne.

Obsah jedného vrecka rozpustíte v 62,5 ml (približne polovica pohára) neperlivé vody.

Dennú dávku je možné rozdeliť na niekoľko podaní. Dávka sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od individuálnej odpovede na liečbu. V každom prípade odporúčame poradiť sa s lekárom. Prípravok u detí používajte len po odporúčaní lekára. Maximálna denná dávka zvyčajne nepresiahne 3 vrecká.

4. Kontraindikácie

Dr. Max Macroglol nepoužívajte pri:

- zúžení čriev,
- perforácii čriev,
- zápalovým ochorením čriev (napríklad Crohnova choroba, ulcerózna kolitída).

Neužívajte v prípade črevnej nepriechodnosti.

Nie sú skúsenosti s užívaním počas tehotenstva a dojčenia, preto užívajte **Dr. Max Macroglol** v prípade potreby len na základe lekárskeho odporúčania.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Dĺžka liečby s prípravkom **Dr. Max Macroglol** by nemala presiahnuť 2 týždne. V prípade potreby možno liečbu opakovat. Dlhšie užívanie môže byť potrebné v prípade refraktérnej a/alebo chronickej zápsy. Takáto zácpa môže byť spôsobená liekmi, liekmi proti bolesti (opioidy) a na liečbu Parkinsonovej choroby (anticholinergiká), alebo sa objaví v dôsledku ochorenia, ako je skleróza multiplex alebo Parkinsonova choroba, ktoré môžu spôsobiť refrakternú zápcu.

5. Vedľajšie účinky

Pri dávkach nevyhnutných na dosiahnutie terapeutického účinku nebol zaznamenaný žiadny výskyt vedľajších účinkov.

Niekedy sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti, škrikanie v bruchu, bolesti brucha, nevolnosť a mierna hnačka (najmä na začiatku). Výnimočne môže dôjsť k hypersenzitívnym reakciám (návaly a žihľavka).

V prípade výskytu akýchkoľvek nežiaducich účinkov, aj iných ako uvedených, sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa so svojim lekárom. Ak zabudnete užít jednu dávku, neberte dvojnásobnú dávku, ale počkajte a užijte ďalšiu dávku.

6. Interakcie s liekmi

Doposiaľ nie sú známe žiadne interakcie s liekmi, ale je vhodné, aby sa podanie prípravku odložilo aspoň o 2 hodiny od užitia perorálne užívaných liekov alebo akýchkoľvek iných liekov (aj homeopatik) alebo potravinových doplnkov, pretože osmotická síla makrogolu a vyvolané zrýchlenie gastrointestinálneho prechodu môžu nepriaznivo ovplyvniť ich účinnosť. Ak užívate iné lieky, pred užívaním **Dr. Max Macroglol** sa poraďte so svojim lekárom.

7. Skladovanie

Dr. Max Macroglol uchovávejte v suchu a mimo dosahu priameho tepla a svetelného žiarenia: vrecúsko otvárajte len pri užívaní. Nepoužívajte v prípade poškodených vreciek. Uchovávejte mimo dosahu detí. Prípravok skladujte pri teplote do 25 °C.

8. Upozornenia a preventívne opatrenia

Perorálna suspenzia sa má pripraviť tesne pred užitím prípravku. Prípravok nepoužívajte u detí mladších ako 6 mesiacov. Neprekračujte odporúčané dávkovanie, pretože vyššie dávky môžu spôsobiť výskyt neočakávaných vedľajších účinkov. Těhotné alebo dojčiace ženy by mali užívať **Dr. Max Macroglol** len po konzultácii s lekárom. Počas liečby liekom **Dr. Max Macroglol** sa odporúča dodržiavať vhodnú diétu a užívať perorálne rehydratačné roztoky (ORS), aby sa predišlo dehydratácii. Odporúčajú sa tiež poradiť sa s lekárom. Nepoužívajte dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa so svojim lekárom. Neužívajte v prípade neznašanlivosti prípravku. Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku a polyetylenglykol. Každé vrecúško je na jedno použitie a malo by sa otvoriť len bezprostredne pred použitím.

9. Dátum expirácie

Neužívajte po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale. Dátum expirácie sa vztahuje na výrobok skladovaný v neporušenom obale.

10. Likvidácia

S pomôckami, ktorým uplynula doba použiteľnosti, sa musí zaobchádzať v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Výrobok ani jeho obal v žiadnom prípade nevyhadzujte do životného prostredia.

Dátum poslednej revízie: 03/2025

PL Macrogol

Macrogol 3350, 14 saszetek

Wyrób medyczny

Instrukcja używania

Stosowany w leczeniu zaparć

Dr.Max⁺

RO Macrogol

Macrogol 3350, 14 plicuri

Dispozitiv medical

Instrucțiuni de utilizare

Util pentru tratamentul constipației

Dr.Max⁺

1. Sposób działania, skład i zastosowanie wyrobu medycznego

Dr. Max Macrogol jest wyrobem medycznym o charakterze środka przeczyszczającego, który, działając na zasadzie osmozy, reguluje w sposób naturalny pracę jelit. Nie ulega wchłonięciu, ani nie podlega fermentacji w przewodzie pokarmowym, nie podrażnia błony śluzowej i jest wydalany ze stolcem. Wyrób medyczny **Dr. Max Macrogol** jest w szczególności stosowany w przypadkach chronicznych zaparć lub sporadycznych zakłóceń w pracy jelit. W istocie, dzięki swojemu powinowactwu do wody, środek **Dr. Max Macrogol** zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnienie bez powodowania skurczów lub bólu brzucha, czy też stanów zagrożenia zdrowia. Jego skuteczność nie zmniejsza się nawet w przypadku długotrwałego stosowania.

1.1 Składniki

Każda saszetka zawiera: Macrogol 3350 10 g.

Substancje pomocnicze: Dwutlenek krzemu, substancja smakowa, sacharynian sodu.

2. Opakowanie

Dr. Max Macrogol jest dostępny w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

Pudełko zawiera 14 saszetek jednorazowego użytku.

3. Dawkowanie i sposób stosowania

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat (poniżej 12 kg): 1 saszetka (10 g) dziennie.

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat (od 12 do 20 kg): 1–2 saszetki (10 g) dziennie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 11 lat (powyżej 20 kg): 1–3 saszetki (10 g) dziennie.

Rozpuścić zawartość saszetki w 62,5 ml (około 1/5 szklanki) niegazowanej wody.

Możliwe jest podzielenie dziennej dawki na kilka podań. Dawka może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie. W każdym przypadku zaleca się zasięgnięcie porady lekarza. Produkt należy stosować u dzieci wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Zazwyczaj maksymalna wymagana dawka nie przekracza 3 saszetek dziennie.

4. Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować wyrobu medycznego **Dr. Max Macrogol**

w następujących przypadkach:

- zwężenie jelit,
- perforacja jelit,
- choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Nie należy przyjmować produktu w przypadku niedrożności jelit.

Brak danych dotyczących stosowania podczas ciąży i karmienia piersią, w związku z tym produkt **Dr. Max Macrogol** można przyjmować tylko wówczas, gdy jest to konieczne, po konsultacji z lekarzem.

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Czas stosowania produktu **Dr. Max Macrogol** nie powinien przekraczać 2 tygodni. W razie potrzeby kurację można powtórzyć. Przedłużone stosowanie może okazać się konieczne w przypadku uporczywych lub chronicznych zaparć. Takie zaparcia mogą być spowodowane przez zażywanie środków odurzających, przeciwbólowych (opiodów) i leków stosowanych w chorobie Parkinsona (leki przeciwcholinergiczne), czy też występować w przypadku takich chorób, jak stwardnienie rozsiane lub choroba Parkinsona, którym mogą towarzyszyć uporczywe zaparcia.

5. Działania niepożądane

Podczas stosowania dawek niezbędnych do uzyskania pożądanego efektu działania produktu nie odnotowano występowania działań niepożądanych.

Niekiedy mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, kruczanie (bruczenie), ból brzucha, mdłości i łagodna biegunka (szczególnie na początku kuracji). Rzadziej mogą wystąpić reakcje uczuleniowe (rumień lub pokrzywka).

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, również innych niż wymienione, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia jednej dawki nie należy przyjmować dawki podwójnej, ale należy poczekać do czasu zastosowania kolejnej dawki.

6. Interakcje z lekami

Do chwili obecnej brak danych na temat interakcji preparatu z lekami, ale wskazane jest przyjmowanie go dopiero po upływie co najmniej 2 godzin od doustnego przyjęcia leków lub innych wyrobów medycznych (również leków homeopatycznych), czy też suplementów diety, ponieważ osmotyczne działanie makrogolu i wynikać stąd zwiększenie szybkości pasażu treści przewodu pokarmowego może negatywnie wpłynąć na ich skuteczność.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu **Dr. Max Macrogol**, jeśli pacjent przyjmuje inne leki.

7. Przechowywanie

Produkt **Dr. Max Macrogol** należy przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła. Saszetkę należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem. Nie należy przyjmować produktu z uszkodzonych saszetek. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać produkt w temperaturze poniżej 25°C.

8. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiesinę doustną należy sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem produktu.

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Zaleca się nieprzekraczanie zalecanych dawek, ponieważ większe dawki mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych działań niepożądanych. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą stosować produkt **Dr. Max Macrogol** tylko po konsultacji z lekarzem. Podczas stosowania produktu **Dr. Max Macrogol** zaleca się przestrzeganie właściwej diety oraz przyjmowanie doustnych płynów nawadniających (ang. *oral rehydration solutions*, ORS), aby zapobiec odwodnieniu. W tej kwestii zaleca się konsultację z lekarzem.

Nie stosować produktu przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Gdy objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku nietolerancji na produkt.

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki oraz glikol polietylenowy. Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego zastosowania i powinna być otwierana tylko bezpośrednio przed użyciem.

9. Data ważności

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu. Data ważności odnosi się do produktu przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

10. Usuwanie nieużytego produktu

Wyrób medyczny, którego termin ważności wygaś, powinien zostać zutytylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać wyrobu medycznego ani jego opakowania do środowiska naturalnego.

Data ostatniej aktualizacji: 03/2025

1. Identificare, compoziție și scopul DM

Dr. Max Macrogol este un dispozitiv medical laxativ care, prin acțiune osmotică, reglează tranzitul intestinal într-un mod natural. Nu se absoarbe și nici nu fermentează în intestin, nu irită mucoasa și se elimină prin fecale. **Dr. Max Macrogol** este în special potrivit în cazurile de constipație cronică și de tranzit intestinal neregulat, ocazional. De fapt, datorită afinității sale pentru apă, **Dr. Max Macrogol** înmoaie scaunele, facilitând evacuarea fără a provoca crampe, dureri abdominale sau situații de urgență. Eficacitatea sa nu se diminuează în timp.

1.1 Componente

Fiecare plic conține: 10 g de Macrogol 3350.

Excipienți: Dioxid de siliciu, aromă, zaharină sodică.

2. Ambalaj

Dr. Max Macrogol se prezintă sub formă de pulbere pentru soluție orală. Cutia conține 14 plicuri de unică folosință.

3. Doze și metoda de utilizare

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 2 ani (până la 12 kg): 1 plic (10 g fiecare) pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 11 ani (de la 12 kg la 20 kg): 1–2 plicuri (10 g fiecare) pe zi.

Adulți și copii cu vârsta peste 11 ani (sau peste 20 kg): 1–3 plicuri (10 g fiecare) pe zi.

Diluati conținutul unui plic în 62,5 ml (aproximativ o jumătate de pahar cu apă plată).

Este posibil să se împartă doza zilnică în mai multe administrări.

Doza poate fi crescută sau scăzută în funcție de răspunsul individual la tratament. Vă recomandăm, în orice caz, să cereți sfatul medicului. Utilizați produsul la copii numai după sfatul medicului. În mod normal, doza maximă necesară nu depășește 3 plicuri pe zi.

4. Contraindicații

Nu luați **Dr. Max Macrogol** în caz de:

- stenoză intestinală,
- perforație intestinală,
- boală inflamatorie intestinală (de exemplu, boala Crohn, colita ulcerativă).

Nu luați în caz de obstrucție intestinală.

Nu există experiență cu privire la utilizarea în timpul sarcinii și alăptării, prin urmare, luați **Dr. Max Macrogol** numai în caz de necesitate, la sfatul medicului.

La pacienții cu insuficiență renală nu este necesară ajustarea dozei. Durata tratamentului cu **Dr. Max Macrogol** nu trebuie să depășească 3 săptămâni. În caz de nevoie, tratamentul poate fi repetat. Utilizarea prelungită poate fi necesară în caz de constipație refractară și/sau cronică. O astfel de constipație poate fi cauzată de medicamente, analgezice (opioide) și cele pentru tratamentul bolii Parkinson (anticolinergice) sau apare în cazul unor boli cum ar fi scleroza multiplă sau boala Parkinson care pot cauza constipație refractară.

5. Efecte secundare

La dozele necesare pentru a obține un efect terapeutic, nu a fost niciodată raportată apariția de efecte secundare.

În unele cazuri pot apărea tulburări gastro-intestinale, zgomote intestinale, dureri abdominale, greață și diaree ușoară (mai ales la început). Rareori, pot apărea reacții de hipersensibilitate (erupții pe piele și urticarie). Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului în cazul apariției oricăror efecte secundare, chiar și altele decât cele enumerate. Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului dumneavoastră. Dacă ați uitat să luați o doză, nu luați o doză dublă, ci așteptați și luați-o pe următoarea.

6. Interacțiuni cu medicamente

Până în prezent nu se cunosc interacțiuni cu medicamente, dar este recomandat ca utilizarea produsului să fie întârziată cel puțin 2 ore de la momentul administrării medicamentelor care se iau pe cale orală sau a oricăror alte medicamente (de asemenea, medicamente homeopate) sau suplimente alimentare, deoarece puterea osmotică a makrogolului și viteza crescută indusă a tranzitului gastro-intestinal pot afecta negativ eficacitatea acestora.

Adresați-vă totuși medicului dumneavoastră înainte de a lua **Dr. Max Macrogol** în cazul altor terapii existente.

7. Depozitare

A se păstra **Dr. Max Macrogol** într-un loc uscat și ferit de surse directe de căldură sau lumină: deschideți plicul numai atunci când îl utilizați. A nu se utiliza în cazul în care plicurile sunt deteriorate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra dispozitivul la temperaturi sub 25 °C.

8. Atenționări și precauții

Suspensia orală trebuie preparată chiar înainte de administrarea produsului.

A nu se utiliza produsul la copii cu vârsta sub 6 luni.

Se recomandă să nu se depășească dozele recomandate, deoarece dozele mai mari pot determina apariția unor efecte secundare nedorite. Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să ia **Dr. Max Macrogol** numai la recomandarea unui medic.

În timpul tratamentului cu **Dr. Max Macrogol** se recomandă să urmați o dietă adecvată și să luați soluții de rehidratare orală (SRO) pentru a evita deshidratarea, este indicat să vă adresați medicului dumneavoastră.

A nu se utiliza pentru mai mult de 30 de zile consecutive. Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului dumneavoastră.

A nu se administra în caz de intoleranță la produs.

A nu se administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente și la polietilenglicol.

Fiecare plic este de unică folosință și trebuie deschis numai în momentul utilizării.

9. Data limită de utilizare

A nu se lua după data limită de utilizare tipărită pe ambalaj. Data limită de utilizare se referă la produsul în ambalajul său intact, atunci când este depozitat.

10. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie gestionat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor. Nu eliminați, în niciun caz, produsul sau ambalajul acestuia în mediul înconjurător.

Data ultimei revizuirii: 03/2025



