

Algacid Sticks

CZ Tekutý alginát

Návod k použití zdravotnického prostředku CE0426

- redukuje gastroezofageální reflux
- zklidňuje překyselení
- chrání žaludeční sliznici

1. Identifikace, složení a účel použití

Algacid Sticks je produkt užitečný pro kontrolu gastroezofageálního refluxu, pocitu pálení a s tím souvisejících těžkostí.

Algacid Sticks umožňuje regulovat překyselení žaludku, zabraňuje pocitu pálení, bolesti žaludku a s tím související dyspepsii.

Algacid Sticks je účinný bez ohledu na hlavní příčinu problému, navíc může být použit jako doplňková léčba v případě gastritidy.

1.1. Mechanismus účinku

Algacid Sticks obsahuje kombinaci látek synergicky působících v prostředí žaludku.

Alginát je polysacharid izolován z určitých druhů řas. Jakmile se tato látka dostane do kyselého prostředí žaludku, velmi rychle se přeměňuje ve viskózní a lehký gel, který pokrývá a chrání žaludeční sliznici. Konkrétní formulace obsahující alginát sodný a hydrogenuhličitán draselný umožňuje rychlejší působení. Alginátový viskózní gel navíc ztěžuje vzestupu žaludečních pohybů, a proto snižuje počet epizod refluxu. Spojení uhličitanu a hydrogenuhličitanu neutralizuje žaludeční kyselost. Bublínky oxidu uhličitého, které se uvolňují při reakci, jsou zachytávány alginátovým gelem, který se přeměňuje na pěnu, která se vznáší nad povrchem žaludečních štáv.

1.2. Složení

Alginát sodný, uhličitán vápenatý, hydrogenuhličitán draselný.

Pomocné látky: Extrakt ze zázvoru (příchuť), zázvorová silice (příchuť), anýzová a mléčná příchuť, voda, karbomer, methylparahydroxybenzoát sodná sůl, sukralóza.

2. Balení

Balení obsahuje 14 sáčků.

3. Dávkování a způsob použití

Dospělí a dospívající (12-18 let): doporučené denní dávkování je 1 sáček po dvou hlavních chodech a před spaním po dobu minimálně 2 týdnů, do odeznění příznaků. Pokud i po měsíci užívání produktu příznaky stále přetrvávají, poraďte se se svým lékařem. Tyto dávky účinně působí proti žaludečnímu překyselení a prevenci gastroezofageálního refluxu. Nepřekračujte doporučené dávkování.

4. Nežádoucí účinky

Při dávkách nezbytných k dosažení terapeutického účinku by jediným hlášeným vedlejším účinkem mohla být zácpa a přechodná nevolnost. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

5. Interakce s doplňky stravy a léčivými přípravky

Nejsou známy žádné interakce mezi jednotlivými složkami přípravku Algacid Sticks a doplňky stravy. Nicméně, jak je obecně známo, všechny perorálně užívané léky by měly být užívány minimálně 2 hodiny před nebo 2 hodiny po podání Algacid Sticks.

5. 1. Interakce s léčivými přípravky

Kvůli své viskózní povaze může zdravotnický prostředek prodloužit nebo snížit absorpci souběžně užívaných léků. Proto před užíváním přípravku jako je Algacid Sticks se poraďte se svým lékařem, obzvláště pokud užíváte antikoncepci. Přípravek může být bez omezení kombinován s farmakologickými přípravky obsahujícími omeprazol, cimetidin nebo cisaprid, v těchto případech je však vhodná konzultace s lékařem.

6. Skladování

Skladujte Algacid Sticks na suchém místě od přímého zdroje tepla a světla. Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno. Skladujte mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě mezi 15 °C a 25 °C.

Dr.Max⁺

7. Upozornění a bezpečnostní opatření

Nepoužívat u dětí mladších 12 let. U dospívajících (12 – 18 let) používejte produkt jen pokud je to nezbytné nutné a pod lékařským dohledem. **V případě těhotenství nebo kojení používejte produkt pouze na doporučení lékaře.** Nepřekračujte doporučené dávkování nebo vyšší dávky mohou způsobit zácpu nebo přechodný průjem. Produkt je kontraindikován v případě chronické zácpy nebo průjmu, onemocnění ledvin nebo chronického srdečního selhání. Nepoužívejte produkt déle než 30 po sobě následujících dní, pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Pokud po nějaké době používání produkt nedokázal jasně zmírnit příznaky, doporučujeme poradit se se svým lékařem.

Každý sáček je určen na jedno použití a měl by být otevřen pouze v případě použití. Neužívejte v případě nesnášenlivosti na produkt. Neužívejte při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku.

8. Minimální trvanlivost

Nepoužívejte po datu minimální trvanlivost vyznačeném na obalu. Datum minimální trvanlivosti se vztahuje k produktu skladovanému v neporušeném obalu.

9. Likvidace

Prošlý prostředek musí být zlikvidován v souladu s místními nařízeními. V žádném případě nevyhazujte produkt nebo jeho obal do životního prostředí.

Datum poslední revize textu: 12/2020

Algacid Sticks

SK Tekutý alginát

Návod na použití zdravotníckej pomôcky CE0426

Dr.Max⁺

- znižuje gastroezofageálny reflux
- upokojuje prekyslenie
- chráni žalúdočnú sliznicu

1. Identifikácia, zloženie a účel použitia

Algacid sticks je produkt užitočný pri zmiernení gastroezofageálneho refluxu žalúdočných kyselín, pocitu pálenia a súvisiacich ťažkostí. Algacid Sticks umožňuje regulovať prekyslenie žalúdka, zabraňuje pocitu pálenia, bolesti žalúdka a s tým súvisiacej dyspepsie. Algacid Sticks je účinný bez ohľadu na pôvod ťažkostí, navyše môže byť použitý ako doplnok k liečbe gastritídy.

1.1. Mechanizmus účinku

Algacid Sticks obsahuje kombináciu rôznych látok synergicky pôsobiach v prostredí žalúdka. Alginát je polysacharid izolovaný z určitých typov rias. Keď sa táto látka dostane do kyslého prostredia žalúdka, veľmi rýchlo sa zmení na viskózný a ľahký gél, ktorý kryje a chráni žalúdočnú sliznicu. Konkrétna formulácia obsahujúca alginát sodný a hydrogenuhličitán sodný zaisťuje rýchlejšie pôsobenie. Viskózný alginátový gél sťažuje pohyby žalúdka smerom nahor, a tým znižuje počet epizód refluxu. Spojenie uhličitanu a bikarbonátu neutralizuje žalúdočnú kyslosť. Bublínky oxidu uhličitého, ktoré pri tejto reakcii vznikajú, sú zachytené v alginátovom géle, ktorý sa tým mení na penu, ktorá pláva na povrchu žalúdočných štíav.

1.2. Zloženie

Alginát sodný, uhličitán vápenatý, hydrogenuhličitán draselný.

Pomocné látky: Extrakt zo zázvoru (příchuť), zázvorový esenciálny olej (příchuť), anýzová a mliečna príchuť, voda, karbomér, metylparahydroxybenzoát sodná soľ, sukralóza.

2. Balenie

Balenie obsahuje 14 vreciek.


3. Dávkovanie a spôsob použitia

Dospělí a dospievajúci (12 – 18 rokov): odporúčané denné dávkovanie je jedno vrecko po dvoch hlavných jedlách a pred spaním počas aspoň dvoch týždňov, až do vymiznutia príznakov. Ak aj po mesiaci

 SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY

Distributor/Distribútor/Distribuito:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
MEDIPLUS EXIM SRL, Str. Ciobanului nr. 133,
Mogoșoaia, Ilfov, România



CE 0426

12/20

pravidelného užívania ťažkosti stále pretrvávajú, obráťte sa na svojho praktického lekára. Tieto dávky účinne pôsobia proti prekysleniu žalúdka a v prevencii gastroezofageálneho refluxu. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

4. Vedľajšie účinky

Pri dávkach nevyhnutných na dosiahnutie terapeutického účinku by jediným zaznamenaným vedľajším účinkom mohla byť zápcha a prechodná nevoľnosť. Ak symptómy pretrvávajú, kontaktujte svojho praktického lekára.

5. Interakcie s výživovými doplnkami a liekmi

Nie sú známe žiadne interakcie medzi jednotlivými zložkami Algacid Sticks a výživovými doplnkami. Napriek tomu sa všeobecne odporúča všetky lieky podávať aspoň 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po podaní Algacid Sticks.

5.1 Liekové interakcie

Kvôli svojej viskóznjej povahe môže táto zdravotnícka pomôcka spomaliť alebo znížiť absorpciu súčasne užívaných liekov. Pred podaním prípravku ako je Algacid Sticks konzultujte jeho použitie so svojim praktickým lekárom, najmä ak užívate hormonálnu antikoncepciu. Produkt nie je kontraindikovaný pri použití s liečivami ako omeprazol, cimetidin alebo cisaprid. V týchto prípadoch je pred použitím vhodné poradiť sa so svojim lekárom.

6. Skladovanie

Uskladňujte Algacid Sticks na suchom mieste a mimo zdroja tepla a svetla. Nepoužívajte v prípade, že je balenie poškodené. Uskladňujte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote od 15 °C až do 25 °C.

7. Upozornenia a opatrenia

Nepoužívajte u detí mladších 12 rokov.

U dospievajúcich (12 – 18 rokov) používajte výrobok iba v nevyhnutných prípadoch a pod dohľadom lekára.

V tehotenstve a počas dojčenia produkt používajte iba po konzultácii so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie, pretože vyššie dávky môžu spôsobiť zápchu alebo prechodnú hnačku. Produkt je kontraindikovaný pri chronickej zápche alebo hnačke, ochoreni obličiek alebo chronickom srdcovom zlyhaní. Produkt nepoužívajte viac ako 30 po sebe idúcich dní, ak symptómy pretrvávajú, konzultujte to so svojim lekárom. Ak ani po určitom čase používania produkt nedokázal jasne zmierniť príznaky, odporúčame poradiť sa so svojim lekárom. Každé vrecko je jednorazové a malo by byť otvorené len v prípade použitia. Neužívajte v prípade neznášanlivosti na produkt. Neužívajte v prípade známej precitlivosti na akúkoľvek zložku.

8. Dátum expirácie

Nepoužívajte po dátume expirácie vyznačenom na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na produkt uchovávaný v neporušenom obale.

9. Likvidácia

Prípravok, ktorému vypršala doba použiteľnosti, musí byť zlikvidovaný podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadmi. Produkt alebo jeho obal nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Dátum poslednej revízie textu: 12/2020

Algacid Sticks

RO Alginat lichid

DISPOZITIV MEDICAL CE0426

- Reduce refluxul gastroesofagian

- Calmează hiperaciditatea

- Protejează mucoasa gastrică

1. Identificare, compoziție și scop

Algacid Sticks este un produs util pentru a contracara refluxul gastroesofagian, senzațiile de arsură și senzația de greutate aferentă. Algacid Sticks permite controlul hiperacidității gastrice, prevenind senzația de arsură, durerile de stomac și dispepsia aferentă. Algacid Sticks este eficient indiferent de cauza principală a problemei; în plus, poate fi utilizat ca adjuvant în caz de gastrită.

Dr.Max⁺

Distributor/Distribútor/Distribuitoar:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
MEDIPLUS EXIM SRL, Str. Ciobanului nr. 133,
Mogoșoaia, Ilfov, România

1.1 Mecanismul de acțiune

Algacid Sticks conține o asociere de diferite substanțe sinergice care acționează în mediul gastric. Alginatul este un polizaharid particular izolat de anumite tipuri de alge. Această fibră, ajunsă odată în mediul acid al stomacului, dă naștere foarte rapid la formarea unui gel vâscos și ușor, care acoperă și protejează mucoasa gastrică. Formula particulară, care conține alginat de sodiu și bicarbonat, permite o acțiune mai rapidă. Mai mult decât atât, gelul vâscos cu alginat îngreunează mișcările gastrice de ascensiune și, prin urmare, scade numărul de episoade de reflux. Asocierea carbonatului și bicarbonatului neutralizează aciditatea stomacului. Mai mult, bulele de dioxid de carbon, care se formează în reacție, sunt prinse de gelul de alginat, care este transformat într-o spumă care plutește pe suprafața sucurilor gastrice.

1.2 Componente

Alginat de sodiu, carbonat de calciu, bicarbonat de potasiu. Excipienți: Extract de ghimbir (aromă), ulei esențial de ghimbir (aromă), arome de anason și lapte, apă, Carbomer, parahidroxibenzoat de sodiu metilic, sucraloză.

2. Ambalaj

O cutie conține 14 plicuri.

3. Dozaj și metodă de utilizare

Adulți și adolescenți (12-18 ani): dozajul zilnic recomandat este să luați câte un plic după două mese principale și înainte de culcare cel puțin două săptămâni, până la dispariția simptomelor. Dacă după o lună de utilizare a produsului starea încă persistă, consultați un medic. Aceste doze sunt eficiente pentru a combate hiperaciditatea gastrică și pentru a preveni refluxul gastroesofagian. Nu depășiți doza sugerată.

4. Efecte secundare

La dozele necesare obținerii unui efect terapeutic, singurele reacții adverse raportate ar putea fi constipația și greața tranzitorie. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

5. Interacțiuni cu suplimente alimentare și cu medicamente

Pentru componentele Algacid Sticks nu sunt cunoscute interacțiuni cu suplimentele alimentare. Cu toate acestea, ca regulă generală, toate medicamentele orale ar trebui să fie ingerate cel puțin cu două ore înainte sau două ore după utilizarea Algacid Sticks.

5.1 Interacțiuni medicamentoase

Datorită naturii sale vâscoase, dispozitivul medical poate întârzia sau reduce absorbția medicamentelor administrate concomitent. Prin urmare, consultați un medic înainte de a începe să utilizați un produs precum Algacid Sticks, mai ales atunci când utilizați anticoncepționale. Produsul poate fi asociat fără contraindicații cu produse farmacologice, cum ar fi omeprazol, cimetidin sau cisapridă; în aceste cazuri, este recomandat să consultați medicul.

6. Depozitare

Păstrați Algacid Sticks într-un loc uscat și departe de căldură directă sau surse de lumină. Nu folosiți dacă cutia este deteriorată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Păstrați dispozitivul între 15°C și 25°C.

7. Avertismente și precauții

Nu folosiți la copii sub 12 ani. La adolescenți (12-18 ani) folosiți produsul numai dacă este strict necesar și sub supraveghere medicală. În caz de sarcină sau alăptare, utilizați produsul numai la sfatul medicului. Nu depășiți doza sugerată, deoarece cantitățile mai mari pot provoca apariția constipației sau diaree tranzitorie. Produsul este contraindicat în cazuri de constipație cronică sau diaree, boli renale sau insuficiență cardiacă cronică. Nu folosiți produsul mai mult de 30 de zile consecutive, dacă simptomele persistă, consultați medicul. Dacă după un timp de utilizare, produsul nu a fost capabil să reducă simptomele în mod clar, se recomandă să consultați un medic. Fiecare plic este de unică folosință și trebuie deschis doar în momentul utilizării. Nu luați în caz de intoleranță la produs. Nu luați în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente.

8. Data expirării


Nu luați după data de expirare imprimată pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul depozitat în recipientul său intact.

9. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie gestionat în conformitate cu reglementările privind gestionarea deșeurilor de la entitatea locală. Nu aruncați în niciun caz produsul sau ambalajul său în mediu.

Data ultimei revizii: 12/2020

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY



CE 0426

12/20