CZ Algacid Gum

Dr.Max

Žvýkací guma Algacid
Zdravotnický prostředek
Návod k použití

Dr. Max Algacid Gum je zdravotnický prostředek, obsahující kombinaci alginátu, uhličitanu vápenatého a hydroxidu hořečnatého, vhodný k léčbě a prevenci příznaků souvisejících s laryngofaryngeálním nebo gastroezofageálním refluxem a překyselením žaludku.

Mechanismus účinku
Dr. Max Algacid Gum obsahuje kombinaci látek, které působí synergicky:
- uhličitanové a hydroxidové soli mají tlumící účinek: neutralizují žaludeční kyselost, předcházejí a působí proti podráždění sliznice spojenému s bolestí a pocitem pálení;
- alginát má ochranný účinek: vytváří tenkou a přetrvávající vrstvu hlenu, která pokrývá povrch hrtanu a jícnu.

Dr. Max Algacid Gum se vyznačuje rychlým a prodlouženým uvolňováním:
- rychlý účinek je dán uhličitanovými a hydroxidovými solemi v potahu, které se okamžitě uvolňují v dutině ústní, rychle zvyšují pH v ústech a po polknutí slin také v ezofagogastrickém spojení (spojení jícnu a žaludku), což přináší první úlevu od překyselení žaludku;
- prodloužený účinek je dán solemi a alginátem ve žvýkací gumě: nepřetržité žvýkání umožňuje postupné uvolňování funkčních látek.

Složení
Funkční látky: hydroxid hořečnatý, uhličitan vápenatý, alginát sodný.
Pomocné látky: zázvorová silice, olejový extrakt ze zázvoru, žvýkačkový základ, stearan hořečnatý, xylitol, sójový lecitin, mátová příchuť, mentol, acesulfam K, arabská guma, oxid křemičitý.

Balení
Lahvička obsahující 20 jednorázových žvýkacích gum.

Dávkování
Dospělí a děti od 12 let:
1–2 žvýkací gumy se užívají 20–60 minut po každém hlavním jídle (oběd a večeře) a/nebo před spaním. Maximálně 6 žvýkacích gum denně.
Doporučuje se neužívat 2 žvýkací gumy současně.

Nežádoucí účinky
Při dávkách potřebných k dosažení léčebného účinku jsou nežádoucí účinky vzácné.
Závažné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u pacientů trpících onemocněním ledvin, esenciální hypertenzí nebo kardiovaskulárními nemocemi. Tito pacienti by se měli před užitím produktu poradit s lékařem.
Produkt může mít projímavé účinky, protože obsahuje xylitol.
V případě výskytu nežádoucích účinků přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Interakce s doplňky stravy a léky
Tento zdravotnický prostředek se musí užívat alespoň dvě hodiny před nebo dvě hodiny po podání léků a doplňků stravy. V případě souběžného užívání léků (jako jsou např. antibiotika a srdeční glykosidy) se před použitím produktu poraďte s lékařem.

Skladovací podmínky
Dr. Max Algacid Gum skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25 °C.

Upozornění
Nepoužívejte u dětí mladších 12 let.
Nepoužívejte v případě alergie nebo známé přecitlivělosti na složky produktu.
Během těhotenství a kojení se doporučuje užívat produkt po konzultaci s lékařem.
Dr. Max Algacid Gum je kontraindikován u pacientů s hyperkalcemií, hypermagnezemií a akutními gastrointestinálními stavy (žaludeční poranění, rektální fisury, střevní neprůchodnost, chronický průjem).
Tento produkt obsahuje sóju: nepoužívejte v případě alergie na tuto složku.
Neužívejte produkt vleže.
Nepřekračujte doporučené dávkování; v případě nežádoucích účinků přerušte používání produktu a poraďte se s lékařem.
Neužívejte déle než 30 po sobě následujících dní. Pokud po 7 dnech užívání nedosáhnete znatelného zlepšení příznaků, je lepší přestat produkt používat a poradit se s lékařem.
Pokud je lahvička poškozená, žvýkací gumu neužívejte.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Nepolykejte.
Případnou závažnou nežádoucí příhodu nahlaste výrobci a příslušnému úřadu.

Likvidace
Po uplynutí doby použitelnosti je nutné s produktem nakládat v souladu s místními předpisy.
V žádném případě nevyhazujte produkt ani jeho balení do životního prostředí.

Datum poslední revize: Duben 2024

SK Algacid Gum

Dr.Max

Žuvacia guma Algacid
Zdravotnícka pomôcka
Návod na použitie

Dr. Max Algacid Gum je zdravotnícka pomôcka obsahujúca kombináciu alginátu, uhličitanu vápenatého a hydroxidu horečnatého, vhodná na liečbu a prevenciu príznakov súvisiacich s laryngofaryngeálnym alebo gastroezofageálnym refluxom a prekyslením žalúdka.

Mechanizmus účinku
Dr. Max Algacid Gum obsahuje kombináciu zložiek, ktoré pôsobia synergicky:
- uhličitanové a hydroxidové soli majú tlmivý účinok: neutralizujú žalúdočnú kyslosť, zabraňujú a pôsobia proti podráždeniu sliznice spojenému s bolesťou a pocitom pálenia;
- alginát má ochranný účinok: vytvára tenkú a pretrvávajúcu vrstvu hlienu, ktorá pokrýva povrch hrtana a pažeráka.

Dr. Max Algacid Gum sa vyznačuje rýchlym a predĺženým uvoľňovaním:
- rýchly účinok je spôsobený uhličitanovými a hydroxidovými soľami v povlaku, ktoré sa okamžite uvoľňujú v ústnej dutine a rýchlo zvyšujú pH v ústach a po prehltnutí slín aj v ezofagogastrickom spojení (spojenie pažeráka a žalúdka), čo prináša prvú úľavu od prekyslenia žalúdka;
- predĺžený účinok zaisťujú soli a alginát v žuvacej gume: nepretržité žuvanie umožňuje postupné uvoľňovanie funkčných zložiek.

Zloženie
Funkčné zložky: hydroxid horečnatý, uhličitan vápenatý, alginát sodný.
Pomocné látky: zázvorová silica, olejový extrakt zo zázvoru, základ žuvacej gumy, stearan horečnatý, xylitol, sójový lecitín, mätová príchuť, mentol, acesulfám K, arabská guma, oxid kremičitý.

Balenie
Fľaštička obsahujúca 20 jednorazových žuvacích gúm.

Dávkovanie
Dospelí a deti od 12 rokov:
1 – 2 žuvacie gumy sa užívajú 20 – 60 minút po každom hlavnom jedle (obed a večera) a/alebo pred spaním. Maximálne 6 žuvacích gúm denne.
Odporúča sa neužívať 2 žuvacie gumy súčasne.

Nežiaduce účinky
Pri dávkach potrebných na dosiahnutie liečebného účinku sú nežiaduce účinky vzácne.
Závažné nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť u pacientov trpiacich ochorením obličiek, esenciálnou hypertenziou alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami. Títo pacienti by sa mali pred užitím produktu poradiť s lekárom.
Produkt môže mať preháňacie účinky, pretože obsahuje xylitol.
V prípade výskytu nežiaducich účinkov prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom.

Interakcie s výživovými doplnkami a liekmi
Táto zdravotnícka pomôcka sa musí užívať aspoň dve hodiny pred alebo dve hodiny po podaní liekov a výživových doplnkov. V prípade súbežného užívania liekov (ako sú napr. antibiotiká a srdcové glykozidy) sa pred použitím produktu poraďte s lekárom.

Skladovacie podmienky
Dr. Max Algacid Gum skladujte v chlade a suchu, pri teplote do 25 °C.

Upozornenia
Nepoužívajte u detí mladších ako 12 rokov.
Nepoužívajte v prípade alergie alebo známej precitlivenosti na zložky produktu.
Počas tehotenstva a dojčenia sa odporúča užívať produkt po konzultácii s lekárom.
Dr. Max Algacid Gum je kontraindikovaný u pacientov s hyperkalciémiou, hypermagneziémiou a akútnymi gastrointestinálnymi stavmi (žalúdočné poranenie, rektálne fisúry, črevná nepriechodnosť, chronická hnačka).
Tento produkt obsahuje sóju: nepoužívajte v prípade alergie na túto zložku.
Produkt neužívajte v ľahu.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie; v prípade nežiaducich účinkov prerušte používanie prípravku a poraďte sa s lekárom.
Neužívajte dlhšie než 30 po sebe nasledujúcich dní. Ak po 7 dňoch nedosiahnete viditeľné zlepšenie príznakov, je lepšie prestať produkt používať a poradiť sa s lekárom.
Ak je fľaša poškodená, žuvacie gumy neužívajte.
Uskladňujte mimo dosahu detí.
Neprehĺtajte.
Prípadnú závažnú nehodu nahláste výrobcovi a príslušnému úradu.

Likvidácia
S produktom po exspirácii je potrebné zaobchádzať v súlade s miestnymi predpismi.
V žiadnom prípade nevyhadzujte produkt ani jeho balenie do životného prostredia.

Dátum poslednej revízie: Apríl 2024

RO Algacid Gum

Gumă de mestecat Algacid
Dispozitiv medical
Instrucțiuni de utilizare

Dr. Max Algacid Gum este un dispozitiv medical care conține o combinație de alginat, carbonat de calciu și hidroxid de magneziu, util pentru tratamentul și prevenirea simptomelor corelate cu refluxul laringo-gastroesofagian și cu hiperaciditatea gastrică.

Mecanism de acțiune
Dr. Max Algacid Gum conține o asociere de ingrediente care acționează sinergic:
- sărurile de carbonat și de hidroxid exercită o acțiune tampon: acestea neutralizează aciditatea gastrică, prevenind și contracarând iritarea mucoasei asociată cu durerea și senzația de arsură;
- alginatul exercită o acțiune protectoare: formează un strat de mucus subțire și persistent care acoperă suprafața laringelui și a esofagului.

Dr. Max Algacid Gum are o eliberare rapidă și prelungită:
- efectul rapid este dat de sărurile de carbonat și hidroxid din înveliș, care se eliberează imediat în cavitatea bucală, astfel crescând rapid pH-ul din cavitatea bucală și, după înghițirea salivei, și la nivel gastroesofagian (legătura dintre esofag și stomac), oferind o primă ameliorare a hiperaciditătii gastrice;
- efectul prelungit este dat de sărurile și alginatul din gumă de mestecat: mestecarea continuă permite eliberarea treptată a ingredientelor funcționale.

Compoziție
Ingrediente funcționale: hidroxid de magneziu, carbonat de calciu, alginat de sodiu.
Excipienți: ulei esențial de ghimbir, extract uleios de ghimbir, bază de gumă, stearat de magneziu, xilitol, lecitină din soia, aromă de mentă, mentol, acesulfam K, gumă arabică, dioxid de siliciu.

Ambalaj
Flacon conținând 20 de gume de mestecat de unică folosință.

Doză
Adulți și copii de la vârsta de 12 ani:
1-2 gume de mestecat luate la 20-60 minute după fiecare masă principală (prânz și cină) și/sau înainte de culcare. Maximum 6 gume de mestecat pe zi.
Se recomandă să nu se ia 2 gume de mestecat în același timp.

Efecte secundare
La dozele necesare obținerii unui efect terapeutic, efectele secundare au fost rare.
Efecte adverse severe pot apărea la pacienții care suferă de afecțiuni renale, hipertensiune arterială esențială sau boli cardiovasculare, care trebuie să primească recomandarea medicului înainte de a lua produsul.
Produsul poate avea efecte laxative, deoarece conține xilitol.
În caz de apariție a efectelor secundare, întrerupeți tratamentul și adresați-vă unui medic.

Interacțiuni cu suplimente alimentare și cu medicamente
Dispozitivul medical trebuie luat cu două ore înainte sau după administrarea de medicamente și suplimente alimentare. Adresați-vă unui medic înainte de a lua produsul în cazul terapiilor medicamentoase concomitente (precum antibiotice și glicozide cardiace).

Condiții de depozitare
Depozitați **Dr. Max Algacid Gum** într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură sub 25 °C.

Atenționări
A nu se utiliza sub 12 ani.
A nu se utiliza în caz de alergie sau hipersensibilitate cunoscută la componentele produsului.
În timpul sarcinii și alăptării se recomandă luarea produsului după sfatul medicului.
Dr. Max Algacid Gum este contraindicat la pacienții care suferă de hipercalcemie, hipermagneziemie și afecțiuni gastrointestinale acute (leziuni gastrice, fisuri anale, obstrucții intestinale, diaree cronică).
Acest produs conține soia: a nu se utiliza în caz de alergie la acest component.
A nu se lua produsul în timp ce stați culcat.
A nu se depăși doza recomandată; în caz de efecte secundare, întrerupeți utilizarea produsului și adresați-vă unui medic.
A nu se utiliza mai mult de 30 de zile consecutive.
Dacă după 7 zile de utilizare nu ați obținut o ameliorare semnificativă a simptomelor, este mai bine să întrerupeți administrarea produsului și să vă adresați unui medic.
A nu se lua gumele de mestecat dacă flaconul este deteriorat.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se înghiți.
În cazul unui incident grav, raportați producătorului și autorității competente.

space free for to insert pharma code

Eliminare
Produsul expirat trebuie gestionat în conformitate cu legile locale.
Nu aruncați în niciun caz produsul sau ambalajul acestuia în mediu.

Data ultimei revizuiri: Aprilie 2024

S.I.I.T. S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Itálie/Taliansko/Italia
surveillance@siit-it.com

VE0226
MD CE 0426

Dr.Max Dr.Max Pharma, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS	
PRODUCT NAME:	Algacid Gum		Black
BAR CODE:	8595566423100		
DIMENSION (rozměr):	135 x 270 mm		
DATE:	06. 03. 2026		
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz			